

LA MANIPOLAZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO PROVOCATA DALLE VACCINAZIONI PRECOCI E MULTIPLE È LA CAUSA DELL'ESPLOSIONE DELLE MALATTIE CRONICHE E DELLE DISABILITÀ EMERGENTI?

SE INTENDETE VACCINARE IL VOSTRO BAMBINO, QUESTI SONO ALCUNI SEGNI E I SINTOMI DELLE REAZIONI AVVERSE AI VACCINI

VACCINAZIONI

La tua salute, la tua famiglia, la tua scelta

COSA FARE IN CASO DI REAZIONE AVVERSA AD UN VACCINO

Qualsiasi cambiamento dello stato di salute del vostro bambino dopo la vaccinazione va segnalato e registrato. E' compito del pediatra inoltrare alla ASL la scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa. Anche i genitori possono compilare una loro scheda di sospetta reazione avversa. Consultate il sito dell'agenzia italiana del farmaco (AIFA), all'indirizzo:

<http://goo.gl/q411v>

REGISTRATE LA REAZIONE

AVVERSA ANCHE ALL'INDIRIZZO

<http://goo.gl/VZsbw>

La legge 210/92 prevede che "Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato ..."

Lo Stato quindi ammette che le vaccinazioni possano arrecare danni alla salute e che questi siano indennizzati. La sussistenza del nesso causale fra una vaccinazione ed una reazione avversa può essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manca la prova della preesistenza, concomitanza e sopravvenienza di altri fattori determinanti.

| LA REAZIONE AVVERSA | LA DESCRIZIONE DI UNA MADRE |
|--|---|
| Febbre alta (oltre 39.5°C) | "La sua temperatura era sui 39.5°C. Ho dovuto tamponargli la fronte con una garza fresca per abbassargli la febbre, gli ho dato del paracetamolo ..." |
| Reazioni cutanee (orticaria, eruzioni cutanee, gonfiore) | "Si è formato un rossore ed un rigonfiamento nella zona dell'iniezione che è rimasto per settimane" |
| Urla, pianto inconsolabile | "E 'stato un grido di dolore, un grido acuto che è durato per ore, giorni, settimane, ... e nulla sembrava poter essere d'aiuto" |
| Collasso, shock | "Si voltò, bianco in viso, con una sfumatura blu intorno alla bocca e se ne andò completamente inerte ..." |
| Sonnolenza eccessiva | "E 'svenuto e non siamo riusciti a svegliarlo, dargli da mangiare o qualsiasi altra cosa per più di 12 ore" |
| Convulsioni | "I suoi occhi si contrassero, gli tremava il mento, il suo corpo si irrigidì e poi cominciò a tremare" |
| Infiammazione cerebrale | "L'avevo appena depresso nella sua culla, aveva gli occhi spalancati, poi ha cominciato ad inarcare la schiena e ad urlare e poi ha perso conoscenza. Ora ha convulsioni." |
| Cambiamento del comportamento | "Non vuole dormire o mangiare. Si getta a terra e urla senza motivo. Era dolce e felice e ora è fuori controllo. Si è trasformato in un bambino completamente diverso." |
| Regressioni mentale e fisica | "Mio figlio di 18 mesi ha smesso di parlare e camminare dopo il vaccino. Ha sviluppato una grave forma allergica, ha frequentemente la diarrea, infezioni dell'orecchio ed è sempre malaticcio" |



I NOSTRI FIGLI SONO SEMPRE PIÙ VACCINATI E SONO SEMPRE PIÙ MALATI

Allergie, malattie autoimmuni e malattie neurologiche sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi decenni. E' una grave emergenza per la salute dei bambini. In USA si stima che 1 bambino su 6 presenti difficoltà di apprendimento; 1 su 9 asma bronchiale; 1 su 10 ADHD; 1 su 450 diabete; 1 su 88 autismo. Nel nostro Paese non abbiamo nemmeno dati ufficiali, ma è evidente l'aumento di queste patologie, accompagnato da un incremento dei casi di encefalopatie, malattie neurologiche e disfunzioni del sistema immunitario.

Non esistono certezze che vaccinazioni multiple, eseguite precocemente non abbiano relazione con l'aumento della frequenza di queste malattie.



Associazione COMILVA

www.comilva.org; info@comilva.org

CoRiV Coordinamento per la Ricerca e l'Informazione sulle Vaccinazioni

www.coriv.org; info@coriv.org

40 Dosi, 12 Vaccini, Prima dei 6 anni 53 Dosi, 14 Vaccini, Prima dei 18 anni

Prima di correre il rischio, Informatevi e scoprite di che cosa si tratta!

Fatevi sempre queste domande prima di scegliere un vaccino
 Conosco le malattie per cui vaccino mio figlio? C'è un rischio concreto di contrarre queste malattie? Sono davvero molto gravi?
 Mi hanno informato sulle possibili reazioni avverse? Mi forniranno il nome commerciale e il numero di lotto del vaccino?
 C'è stata una reazione avversa ad una precedente vaccinazione o una storia familiare di problemi neurologici o del sistema immunitario? So che posso fare una scelta consapevole?

| Gravidanza | Nascita | 2-3 mesi | 5-6 mesi | 11-12 mesi | 13-15 mesi | 5-6 anni | 11-18 anni |
|---|---|---|--|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Influenza | <ul style="list-style-type: none"> • Epatite B (*) | <ul style="list-style-type: none"> • Difterite • Tetano • Epatite B • Polio • Pertosse • Haemophilus influenzae b • Pneumococco • Rotavirus | <ul style="list-style-type: none"> • Difterite • Tetano • Epatite B • Polio • Pertosse • Haemophilus influenzae b • Pneumococco • Rotavirus • Influenza** | <ul style="list-style-type: none"> • Difterite • Tetano • Epatite B • Polio • Pertosse • Haemophilus influenzae b • Pneumococco | <ul style="list-style-type: none"> • Morbillo • Parotite • Rosolia • Meningococco C • Influenza** | <ul style="list-style-type: none"> • Difterite • Tetano • Pertosse • Polio • Morbillo • Parotite • Rosolia • Influenza** (4) | <ul style="list-style-type: none"> • Difterite • Tetano • Pertosse • Polio • Morbillo • Parotite • Rosolia • Meningococco C • HPV (3) • Varicella (2) |

I VACCINI OBBLIGATORI SONO SOLO 4, DIFTERITE, TETANO, POLIO ED EPATITE B, E SOLO NEL PRIMO ANNO DI VITA.

COSA C'È DENTRO LA FIALA DI UN VACCINO (elenco parziale): virus e batteri modificati in laboratorio, alluminio, mercurio, formaldeide, fenossietanolo, fenolo, sorbitolo, glutaraldeide, borato di sodio, cloruro di sodio, acetato di sodio; solfato di ammonio, glutammato monosodico (MSG), acido cloridrico, perossido di idrogeno, lattosio, gelatina, proteina di lievito, ovoalbumina, siero di albumina di origine umana o bovina; antibiotici; sostanze e contaminanti non identificati.

(*) Bambini nati da madri positive per HBsAg (**) Nei bambini considerati a rischio



COMILVA
www.comilva.org
www.coriv.org